BULLETIN DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
2e Série — Tome 42 — N° 6, 1970 (1971), pp. 1228-1237.

NOTES SUR LES ÉRIGONIDES (ARACHNIDES)
XL. Les Érigonides du nord de la France

Par J. DENIS

Les obligations professionnelles d'une longue carrière passée aux environs de Valenciennes ne m'ont pas laissé le loisir de chasses très fréquentes et mes moments de liberté m'éloignaient d'une région assez rébarbative pour le naturaliste parce que surpeuplée et trop bâtie. Cependant, comme je l'ai signalé il y a bien longtemps déjà, Simon avait cité (1926) une seule Araignée du département du Nord et, chose curieuse, c'était un Érigonide peu fréquent, *Tapinocyba biscissa* (O. P. Cambr.) ; aussi, tout ce que je pouvais trouver devait être nouveau pour le département et l'expérience a montré que ce nouveau était bien souvent intéressant. Les meilleures captures ont été signalées dans de courtes notes (voir bibliographie) et la liste, complète à l'époque, des Érigonides a été publiée dans le *Bulletin de la Société entomologique du nord de la France*. Avec 81 espèces et 3 formes secondaires, au point de vue de nos connaissances elle place le Nord au cinquième rang des départements français derrière les Pyrénées-Orientales (105 espèces, 1 sous-espèce), l'ancienne Seine-et-Oise (100), les Alpes-Maritimes (86, 2) et le Calvados (82). Mais ce *Bulletin*, reproduit au duplicateur, est d'accès difficile et de plus les numéros correspondants sont épuisés ; pour éviter que ces renseignements demeurent ignorés des chercheurs futurs, je crois utile de les présenter à nouveau, ce qui fournit l'occasion de quelques commentaires et aussi de quelques additions ou rectifications.

A cette liste s'ajoute celle, beaucoup plus courte, des espèces capturées dans le Pas-de-Calais qui n'était guère mieux connu sous le rapport qui nous occupe, mais pour lequel ma contribution personnelle est beaucoup plus réduite.

Pour compléter le nord de la France en tant que région, il conviendrait d'ajouter au moins une bonne partie des départements de la Somme et de l'Aisne. En ce qui concerne ce dernier département, toutes les localités que j'ai pu relever dans la littérature ou dans lesquelles j'ai moi-même chassé se situent dans la partie méridionale au sud de Guise, aussi n'en est-il pas tenu compte ici. Quant à la Somme mon apport personnel est presque nul ; cependant les espèces les plus communes n'ont pas été reprises dans les « Arachnides de France » de Simon et, comme les notes de du Roselle (1887, 1881, 1891) ne sont pas toujours faciles à trouver, j'ai pensé qu'il était également utile de l'inclure dans ce catalogue dans lequel, par mesure de simplification, je n'ai pas distingué la partie située au nord de la Somme de celle qui se trouve au sud et qui normalement aurait dû être exclue.

J'ai indiqué autrefois (1948) que je considérais les Meionetinae et les Centromerinae comme faisant partie des Érigonides en raison de la position de leur stigmate trachéen, conception révolutionnaire qui trouve sa justification dans un détail anatomique dont, à mon avis, la valeur ne doit pas être négligée ;

cependant, si les *Porrhomma* me paraissent devoir être rapportés aux Linyphiides, je conserve quelque doute au sujet des *Macrargus* et des *Oreonetides* pour lesquels la question serait à revoir. D'autre part, les opinions des auteurs contemporains divergeant beaucoup sur les affinités des espèces entre elles, celles-ci seront citées par ordre alphabétique en maintenant toutefois séparées les trois sous-familles, Erigoninae, Meionetinae et Centromerinae.

Pour réduire autant que possible une bibliographie déjà abondante les références antérieures à 1940 et figurant dans la bibliographie de Bonnet (1945) ne sont pas reproduites. Par ailleurs, pour alléger le texte, les citations se rapportant au *Bulletin de la Société entomologique du nord de la France* ne sont pas reprises. Dans le même dessein, les noms des auteurs les plus fréquemment, et presque exclusivement, cités sont indiqués par leurs seules initiales : E. S., Simon ; F. R., du Roselle ; J. D., Denis. Il en est de même pour les trois départements : N., Nord ; P.-de-C., Pas-de-Calais ; S., Somme.

Erigoninae

Acartauchenius scurrilis (O. P. Cambr.). — S. : Le Crotoy (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887).

Araeoncus humilis (Blackw.). — N. : Douchy [1], Lourches ! S. : Saint-Valéry-sur-Somme (E. S., 1884 ; F. R., 1887) [2].

Aulacocyba subitanea (O. P. Cambr.). — N. : Denain, 1 ♀, 5-v-1947, dans les herbes d'une pelouse ! S. : La Boutillerie (*Tapinocyba s.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887) ; moulin de la Louque à Guémicourt (sur la Bresle) près Montmarquet, 1 ♂, 10-ix-1962, errant dans une pièce d'habitation !

Ceratinella brevipes (Westr.). — N. : Douchy, 1 ♀, 24-v-1942 ! 1 ♂, 2-v-1943 ! Peu fréquente, semble-t-il. S. : Le Crotoy (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887). Cette espèce doit se trouver vraisemblablement tout le long du littoral, elle a été signalée de Knokke (Flandre occidentale) par Becker (1896).

Ceratinella brevis (Wider). — P.-de-C. : Marais de Dannes, 1 ♂, 30-v-1936 !

Ceratinella scabrosa (O. P. Cambr.). — N. : Forêt de Mormal (J. D., 1939 *b*) ; Douchy, 2 ♂, 2-v-1943 et 24-v-1944, dans les hautes herbes !

Cnephalocotes obscurus (Blackw.). — N. : Douchy (J. D., 1934 *c*) ; Denain ! S. : Marais de Formanoir (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887) ; Amiens (*ms* E. S.) ; il s'agit sans doute de la même capture. C'est encore une espèce que l'on doit trouver sur tout le littoral jusqu'à Heyst et Knokke (Becker, 1896).

Cornicularia cuspidata (Blackw.). — N. : Douchy, 1 ♂, 11-xi-1944 ! Forêt de Vicoigne, 1 ♂, 23-ix-1948 ! Dans les herbes et les feuilles mortes (chênes et noisetiers). Espèce appartenant à la faune du littoral belge (Knokke, I.R.N.S.B.).

Cornicularia dulciacensis Denis. — N. : Douchy, 1 ♀, 26-iii-1944 (J. D., 1949). Espèce décrite sur une seule femelle qui semble avoir été égarée ou perdue accidentellement.

1. Devenu officiellement Douchy-les-Mines... bien qu'il n'y ait plus d'exploitations minières.

2. On pourrait sans doute trouver dans la région de Maubeuge *Asthenargus paganus* (Simon) qui a été recueilli à Barbençon dans le Hainaut belge (collections de l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, I.R.S.N.B.).

Cornicularia unicornis (O. P. Cambr.). — N. : Marais et bois de Douchy (J. D., 1934 *c*) [1] ; forêt de Vicoigne ! Bois de Phalempin près Lille (M. Gouilliart) ; forêt de Nieppe ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, 1 ♀, 5-vi-1955 ! S. : Bois de Trou Wargnier à Saint-Fuscien (F. R., 1891). Connue du littoral belge (La Panne, Coxyde, Blankenberge ; I.R.S.N.B.) ; également du Hainaut.

Dicymbium nigrum (Blackw.). — N. : Forêt de Mormal, Douchy, Denain, forêt de Marchiennes ! Bois de Phalempin (M. Gouilliart) ; forêt de Nieppe ! S. : Amiens, Le Crotoy, Ault (E. S., 1884 ; F. R., 1887). Le seul mâle capturé dans le marais de Douchy appartient à la forme *brevisetosa* Locket (J. D., 1962).

Dicymbium tibiale (Blackw.). — N. : Douchy, 1 ♀, 15-viii-1944 ! Forêt de Marchiennes, 1 ♂, 23-vi-1960 !

Diplocephalus cristatus (Blackw.). — N. : Denain, 1 ♀, 22-ix-1946, sous une pierre ! 1 ♂, 11-vii-1968, dans les herbes ! L'espèce n'est vraiment pas fréquente, alors qu'habituellement elle est banale. S. : Ault (*ms* E. S.).

Diplocephalus latifrons (O. P. Cambr.). — N. : Douchy !

Diplocephalus permixtus (O. P. Cambr.). — N. : Wavrechain-sous-Denain, 1 ♂, 11-xi-1945, dans le marais ! Marais de Douchy (J. D., 1943 *b* ; d'autres captures assez nombreuses depuis) ! P.-de-C. : Dannes, dans la dune (*Streptosphaenus p.*, J. D., 1937 *d*).

Diplocephalus picinus (Blackw.). — N. : Douchy (*Plaesiocraerus p.*, J. D., 1945) ; forêt de Marchiennes, 1 ♀, 3-vi-1951 ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, 1 ♀, 5-vi-1955 ! L'espèce se trouve dans le Hainaut belge (I.R.S.N.B.).

D. picinus humiliceps (Denis). — N. : Marais de Douchy, 1 ♂, 23-v-1944 (J. D., 1945). Connu par un seul mâle dont le lobe céphalique a complètement disparu ; il est possible qu'il s'agisse là d'une variation individuelle ; je n'ai en tout cas pas rencontré d'anomalie analogue sur le matériel assez nombreux, de provenances diverses, qu'il m'a été donné d'examiner.

Dismodicus bifrons (Blackw.). — N. : Forêt de Mormal (*D. elevatus*, J. D., 1944) ; Douchy, forêt de Marchiennes ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais ! S. : Canaples (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1891). L'espèce se trouve dans les dunes du littoral belge (La Panne, I.R.S.N.B.).

Dismodicus elevatus (C. L. Koch). — N. : Forêt de Marchiennes, 1 ♀, 25-vi-1960 ! 2 ♀, 16-vi-1963 ! Sur Pin sylvestre. L'espèce appartient également à la faune des dunes belges (La Panne, I.R.S.N.B.).

Donacochara speciosa (Thor.). — N. : Marais de Douchy (J. D., 1943 *b*). Espèce qui en France n'est connue que de trois stations ; comme elle vivait sur la végétation au plus profond du marais inondé, il est à espérer qu'elle a réussi à subsister. S. : Marais de Fortmanoir (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887).

Drepanotylus uncatus (O. P. Cambr.). — N. : Wavrechain-sous-Denain, 1 ♀, 11-xi-1945, dans le marais ! Espèce très rare en France, dont la présente station est aussi menacée de disparition.

Entelecara acuminata (Wider). — N. : Douchy ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais ! S. : Saint-Valéry-sur-Somme (F. R., 1888).

1. L'espèce était assez fréquente autrefois dans le marais de Douchy dont j'avais signalé (1947 *b*) la richesse faunistique ; depuis, ce marais a été longtemps inondé et une partie a été convertie en dépôt d'ordures. Quant au bois de Douchy, il doit disparaître pour livrer passage à une autoroute. On peut regretter que ces biotopes intéressants, et surtout le premier, n'aient pu être sauvegardés ; de tels biotopes ne sont pas si fréquents dans le Nord.

Entelecara aestiva Simon. — N. : Forêt de Raismes, 1 ♀, 19-VI-1960, sous un tronc abattu ! Capture assez inattendue d'une espèce plutôt méridionale qui n'était pas connue au nord de la Nièvre et du Maine-et-Loire ; cependant la détermination ne me semble pas prêter au doute.

Entelecara erythropus (Westr.). — N. : Douchy (J. D., 1945) ; forêt de Raismes, 1 ♀, 19-VI-1960, dans les herbes rares d'un talus ! S. : Le Crotoy (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887). Il s'agit de l'espèce qui par suite d'une erreur de TULGREN a un moment été appelée à tort *E. media* Kulcz. par les auteurs allemands et britanniques (cf. LOCKET & MILLIDGE, 1962) ; elle se trouve sur le littoral belge (La Panne, Zeebrugge, Knokke ; I.R.S.N.B.).

Entelecara flavipes (Blackw.). — S. : Amiens (F. R., 1888).

Erigone atra (Blackw.). — N. : Anzin, Hérin, Wavrechain-sous-Denain, Douchy, Rœulx ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais ! S. : Saint-Valéry-sur-Somme, Ault (E. S., 1884 ; F. R., 1887) [1].

Erigone dentipalpis (Wider). — N. : Hérin, Douchy, forêt de Raismes, Lille ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais ! S. : Dunes du Crotoy, molières de Saint-Valéry-sur-Somme, marais de Béthencourt-Rivière (Béthencourt-sur-Somme) (F. R., 1891) ; Ault (*ms* E. S.).

Erigone longipalpis Sund. — P.-de-C. : Embouchure de la Slack (SOLLAND, 1925). S. : Saint-Valéry-sur-Somme (E. S., 1884 ; F. R., 1887) ; Amiens (*ms* E. S. ; il s'agit sans doute d'une capture différente, car elle est accompagnée de la mention « DU ROSELLE, 21-VIII-1887 » et n'aurait donc pu être citée en 1884). L'espèce existe sur tout le littoral belge (BECKER, 1896, et I.R.S.N.B.).

Erigone vagans Sav. & Aud. — S. : Ault (E. S., 1884 ; F. R., 1887). L'espèce a été prise à Ostende (I.R.S.N.B.).

Erigonella hiemalis (Blackw.). — N. : Avesnes-le-Sec (*Araeoncus h.*, J. D., 1943 *a*). P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, 1 ♀, 15-VI-1958 !

Erigonella ignobilis (O. P. Cambr.). — S. : Longueau (*Troxochrus i.*, E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887) ; île Sainte-Aragone (*Troxochrus i.*, E. S., 1926).

Erigonidium graminicola (Sund.). — N. : Douchy, bois de Wallers ! S. : Marais de Boves (*Gongylidium gr.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Gnathonarium dentatum (Wider). — N. : Wavrechain-sous-Denain, Douchy, Lourches, Neuville-sur-Escaut, forêt de Raismes, forêt de Vicoigne, Wavrechain-sous-Faux, Wasnes-au-Bac, Hem-Lenglet, Brunemont, bords de la Lys à Erquihem, bois Clébert près la Motte-au-Bois, forêt de Nieppe ! S. : Sailly-Bray (sans doute entre Sailly-le-Sec et Bray-sur-Somme) (*Gongylidium d.*, F. R., 1888) ; bords de la Somme à Corbie ! Ault (*ms* E. S.).

Gonatium corallipes (O. P. Cambr.). — S. : Bois de Bacouël-sur-Selle (F. R., 1891 ; E. S., 1926).

Gonatium rubellum (Blackw.). — N. : Bois d'Hartin près Wallers !

Gonatium rubens (Blackw.). — N. : Douchy, bois d'Hartin, forêt de Vicoigne, Fontaine-Notre-Dame ! S. : Bois de Cise (E. S., 1884 ; F. R., 1887).

1. *Erigone arctica* (White) forme *maritima* Kulcz. serait à rechercher sur le littoral du Nord et du Pas-de-Calais ; cette espèce nordique est connue en effet du littoral britannique et semble assez abondante à Knokke et à La Panne (I.R.S.N.B.) ; ont également été trouvées sur le littoral belge les espèces suivantes qui n'ont pas été signalées du territoire français étudié ici : *Phaulothrix hardyi* (Blackw.), *Prosopotheca monoceros* (Wider), *Silometopus ambiguus* (O. P. Cambr.) [non *S. curtus* Simon], *Styloctetor romanus* (O. P. Cambr.) et *Typhochraestus digitatus* (O. P. Cambr.).

Gongylidiellum latebricola (O. P. Cambr.). — P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, 1 ♂, 15-VI-1958 !

Gongylidiellum murcidum Simon. — N. : Marais de Douchy (J. D., 1943 *b* ; d'autres captures postérieures assez nombreuses).

Gongylidiellum vivum (O. P. Cambr.). — N. : Wavrechain-sous-Denain, 3 ♀, 11-XI-1945 ! Douchy, 3 ♂ 1 ♀, 1-V-1944 ! Rœulx, 1 ♀, 31-X-1943 ! Hem-Lenglet, 1 ♂, 14-X-1943 ! Dans le marais ou dans les herbes très humides. L'espèce se trouve sur le littoral belge (La Panne, I.R.S.N.B.).

Gongylidium rufipes (Linné). — N. : Avesnes-le-Sec, Douchy ! Bois de Phalempin (M. Gouilliart). P.-de-C. : Forêt de Clairmarais ! S. : Rue, Amiens, Ault, bois de Cise (E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Hypomma bituberculatum (Wider). — N. : Douchy, Lourches, Neuville-sur-Escaut, forêt de Marchiennes, Wasnes-au-Bac ! P.-de-C. : Marais de Dannes ! S. : Corbie ! Rue, fossé des Prairies (*Gonatium b.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887 ; le fossé des Prairies correspond sans doute à la mention de Longueau, E. S., 1884 ; par contre l'indication « Amiens, du Roselle, 21-VII-1887 » relevée dans les notes manuscrites de Simon doit se rapporter à une autre capture puisqu'elle est postérieure à 1884).

Hypomma cornutum (Blackw.). — N. : Forêt de Marchiennes, 11 ♀, 16-VI-1963, sur Pin sylvestre et Chêne ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, 1 ♀, 15-VI-1958 ! 2 ♀, 4-VI-1961 !

Hypomma fulvum (Bös.). — N. : Marais de Douchy (*Hypomma mallezi*, J. D., 1943 *a* ; J. D., 1943 *b*, 1944) ; Neuville-sur-Escaut (J. D., 1943 *b*, 1944). C'est encore une espèce menacée de disparition dans une de ses rares stations françaises, et précisément dans celle où elle était la plus abondante ; elle a été prise dans le Hainaut belge et sur le littoral à Nieuport (I.R.S.N.B.).

Lessertia dentichelis (Simon). — N. : Anciennes mines de Douchy à Douchy et à Lourches (J. D., 1930) ; l'espèce était très abondante dans les galeries humides et chaudes de 100 à 750 m de profondeur ; ces stations ont disparu par suite de l'abandon des exploitations ou du moins elles sont devenues inaccessibles, mais cette Araignée doit se retrouver dans les autres travaux souterrains du Bassin présentant des caractéristiques analogues ; je l'ai en particulier revue dans les travaux de la fosse de Vieux-Condé en 1954 ; quelques rares captures ont été faites dans le marais de Douchy (J. D., 1934 *c*).

Lophomma punctatum (Blackw.). — N. : Wavrechain-sous-Denain, 1 ♀, 11-XI-1945 ! Marais de Douchy (J. D., 1934 *c*, 1943 *a*, 1943 *b*). S. : Bords de la Somme à Corbie, 3 ♂, 8-IX-1945 ! Longueau (E. S., 1926) ; Ault (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887).

Maso gallicus Simon. — N. : Forêts de Raismes, de Vicoigne et de Marchiennes ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, Dannes, Camiers !

Maso sundevalli (Westr.). — N. : Douchy, forêts de Mormal, de Raismes, de Vicoigne, de Marchiennes et de Nieppe ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, Dannes !

Mecopisthes silus (O. P. Cambr.). — P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, 1 ♀, 4-VI-1961 !

Metopobractus prominulus (O. P. Cambr.). — S. : Le Crotoy (E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887). Il est possible que l'espèce se trouve sur tout le littoral sablonneux, elle a été prise en Belgique de La Panne à Knokke (I.R.S.N.B.).

Micrargus herbigradus (Blackw.). — N. : Forêt de Mormal, Douchy, Denain, forêts de Vicoigne et de Marchiennes !

Micrargus subaequalis (Westr.). — N. : Douchy ! Denain, 1 ♀, 30-IX-1946 ! S. : Le Crotoy (*Lophomma laudatum*, F. R., 1891 ; *Nothocyba s.*, E. S., 1926).

Minyrioloides trifrons (O. P. Cambr.). — S. : Le Crotoy (*Entelecara tr.*, E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887). L'espèce a été trouvée sur le littoral belge de La Panne à Knokke (I.R.S.N.B.).

Minyriolus pusillus (Wider). — N. : Denain ! A été trouvée à Heyst et Knokke (Becker, 1896) [1].

Monocephalus fuscipes (Blackw.). — N. : Forêt de Mormal, 1 ♀, 14-VI-1959 ! Douchy, 1 ♀, 21-VI-1944 ! Cette espèce paraît assez commune dans le Hainaut belge (I.R.S.N.B.) ; il semble en être de même de sa congénère *M. castaneipes* (Simon) (I.R.S.N.B.) qui en outre a été capturée dans la réserve du Zwyn à Knokke (P. L. G. Benoit).

Nematogmus sanguinolentus (Walck.). — N. : Avesnes-le-Sec, Noyelle-sur-Selle, Douchy, Denain, Rœulx, Anneux, Fontaine-Notre-Dame, forêts de Vicoigne et de Nieppe, bois Clébert ! S. : Corbie ! Longueau (F. R., 1888).

Oedothorax agrestis (Blackw.). — S. : Saint-Valéry-sur Somme (*Gongylidium a.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887) (J. S., 1947 *a*) [2].

Oedothorax apicatus (Blackw.). — N. : Douchy ! S. : Ault (*Gongylidium a.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887) ; moulin de la Louque !

Oedothorax fuscus (Blackw.). — N. : Forêt de Trélon ! Douchy ! Mare de Sabatier dans la forêt de Raismes [3] ! S. : Le Crotoy, Saint-Valéry-sur-Somme, Ault (*Gongylidium retusum*, E. S., 1884 ; F. R., 1887), moulin de la Louque !

Oedothorax gibbosus (Blackw.). — N. : Douchy, forêt de Marchiennes ! S. : Saint-Quentin-en-Tourmont (*Gongylidium g.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Oedothorax retusus (Westr.). — N. : Douchy ! P.-de-C. : Wissant. S. : Le Crotoy, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Valéry-sur-Somme (*Gongylidium fuscum*, E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Oedothorax tuberosus (Blackw.). — N. : Douchy, Neuville-sur-Escaut, Wasnes-au-Bac ! S. : Le Crotoy, Saint-Quentin-en-Tourmont (*Gongylidium t.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Pelecopsis parallela (Wider). — N. : Douchy, 1 ♂, s.d. ! 2 ♀, 24-V-1942 ! S. : Bois de Cise (*Lophocarenum p.*, E. S., 1884, 1926 ; F. R., 1887).

Pelecopsis nemoralis (Blackw.). — P.-de-C. : Marais d'Hardelot (*Lophocarenum n.*, E. S., 1926). La détermination est un peu douteuse, car une certaine confusion semble avoir existé dans l'identification des espèces du groupe (voir J. A. L. Cooke, 1967) ; cependant il y a quelque chance pour qu'il s'agisse de la véritable *P. nemoralis*, d'autant plus que Simon n'a pas cherché à distinguer la plupart des femelles du genre et que cette citation concerne certainement le mâle.

1. *Moebelia penicillata* (Westr.), qui a été signalée de Braine-le-Comte (Becker, 1896), pourrait se trouver dans le Nord.

2. Il y a peu à ajouter à cette dernière note dont la référence ne sera pas répétée.

3. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un Érigonide, il est intéressant de rappeler la présence dans cette station de *Linyphia impigra* O. P. Cambr. (2 ♂ pris pour mémoire, 19-VI-1960 !), espèce connue de la Somme, mais très rare en France où c'est seulement sa quatrième localité.

Perimones britteni (Jackson). — S. : Tourbières de Longueau (*Maso serratipes*, E. S., 1926).

Pocadicnemis pumila (Blackw.). — N. : Avesnes-le-Sec, Noyelle-sur-Selle, Douchy, Lourches, forêt de Marchiennes ! P.-de-C. : Marais de Dannes ! S. : Le Crotoy, Saint-Quentin-en-Tourmont, marais de Boves (E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Prosopotheca corniculans (O. P. Cambr.). — N. : Forêt de Marchiennes, 1 ♀, 27-VI-1961 ! S. : Bois du Trou Wargnier (F. R., 1891).

Saloca diceros (O. P. Cambr.). — N. : Forêt de Trélon, 1 ♀, 1-V-1958, dans les feuilles mortes dans le Bois de Grand Fresseau en bordure de la route de Pont-de-Sains à Glageon !

Savignya frontata Blackw. — N. : Marais de Douchy (J. D., 1943 *a*, 1943 *b*) ; espèce qui était assez fréquente autrefois dans la localité [1].

Tapinocyba biscissa (O. P. Cambr.). — N. : Lille (*Tapinocyba b.*, E. S., 1926). L'espèce, qui est rare, devrait être retrouvée ailleurs dans la région du nord puisqu'elle est connue aussi des Ardennes (Neufmanil ; *ms* E. S.), de la province de Namur et du Luxembourg belge (I.R.S.N.B.).

Tapinocyba insecta (L. Koch). — N. : Douchy (*Colobocyba i.*, J. D., 1943 *a*, 1943 *b*) ; Lourches, 1 ♀, 23-V-1944, dans les herbes rares d'un crassier métallurgique ! Bois d'Hartin (*Gongylidiellum vivum*, J. D., 1934 *c* ; *Troxochrus i.*, J. D., 1937 *d*). S. : Villers-au-Bois (*Colobocyba i.*, E. S., 1926).

Tapinocyba pallens (O. P. Cambr.). — S. : Ault (E. S., 1884 ; F. R., 1887 ; *Colobocyba p.*, E. S., 1926).

Tapinocyba praecox (O. P. Cambr.). — N. : Denain, 1 ♂, 5-V-1948 !

Tiso vagans (Blackw.). — N. : Douchy ! S. : Saint-Quentin-en-Tourmont, bois de Cise (E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Trachynella nudipalpis (Westr.). — N. : Marais de Douchy (*Trachynotus n.*, J. D., 1934 *c*) ; Neuville-sur-Escaut (J. D., 1943 *b*) ; forêt de Vicoigne, 1 ♂, 23-IX-1948, dans les joncs humides de la Mare à Goriaux !

Trachynella obtusa (Blackw.). — N. : Douchy, 1 ♂, 4-XII-1944, dans les feuilles mortes ! Rœulx (J. D., 1943 *b*). S. : Marais d'Ault (*Walckenaera o.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887 ; le Hable d'Ault, *Trachynotus o.*, E. S., 1926).

Trematocephalus cristatus (Menge). — N. : Douchy (J. D., 1943 *b*).

Trichoncus affinis Kulcz. — P.-de-C. : Forêt de Clairmarais (J. D., 1956 *b*) ; 1 ♂ 2 ♀, 15-VI-1958 ! 5 ♂ 4 ♀, 4-VI-1961 !

Troxochrus scabriculus (Westr.), — N. : Douchy, Denain, Lourches ! S. : Amiens (F. R., 1891).

Tr. scabriculus cirrifrons (O. P. Cambr.). — N. : Denain, 1 ♂ 1 ♀, 23-IX-1946 ! Les auteurs récents considèrent habituellement cette forme comme un simple dimorphisme du mâle.

Walckenaera acuminata Blackw. — N. : Douchy, forêt de Vicoigne ! S. : Bois de Gentelles (E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Wideria antica (Wider). — N. : Denain ! S. : La Boutillerie (F. R., 1891).

1, *Silometopus reussi* (Thor.), qui a été trouvé dans le Hainaut belge (I.R.S.N.B.), pourrait exister dans le Nord.

Wideria cucullata (C. L. Koch). — N. : Forêt de Raismes ! S. : Bois du Petit Léon à Vers (F. R., 1891).

Wideria incisa (O. P. Cambr.). — N. : Douchy (*Prosopotheca i.*, J. D., 1946). J. Wunderlich (1970) a établi que cette femelle est celle de *W. polita* Simon, le nom *incisa* ayant la priorité. Le mâle, connu par un seul exemplaire semblant avoir disparu, qui a été décrit par Simon (1884, 1926) sous le nom de *Prosopotheca incisa*, est celui d'une autre espèce, *Walckenaera vidua* Wund.

Wideria melanocephala (O. P. Cambr.). — N. : Douchy, 1 ♀, 24-vi-1944 (*W. atrotibialis*, J. D., 1955) ! P.-de-C. : Forêt de Clairmarais, 1 ♀, 4-vi-1961 !

Meionetinae

Agyneta subtilis (O. P. Cambr.). — N. : Bois Devigne près Avesnes-le-Sec (J. D., 1943 *a*) ; Wavrechain-sous-Faux, 1 ♀, 16-v-1943 !

Meioneta fuscipalpis (C. L. Koch). — N. : Douchy, Denain, forêt de Marchiennes !

Meioneta mollis (O. P. Cambr.). — N. : Wavrechain-sous-Faux ! S. : Ault (*Sintula pusio*, E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Meioneta rurestris (C. L. Koch). — N. : Anzin, Wavrechain-sous-Denain, Denain, Douchy, Anneux ! Féchain (E. Cavro) ; forêts de Saint-Amand et de Marchiennes, Lille ! S. : Moulin de la Louque !

Meioneta saxatilis (Blackw.). — N. : Forêt de Mormal (*Aprolagus s.*, J. D., 1939 *d*) ; Douchy (*Aprolagus s.*, J. D., 1943 *a*) ; 2 ♂ 3 ♀, 25-v-1944 ! S. : Bois de Cise (*Leptyphantes euchirus*, E. S., 1884 ; *Aprolagus s.*, E. S., 1929).

Meioneta simplicitarsis (Simon). — N. : Douchy ! Il semble que c'est par erreur que j'ai indiqué cette espèce de la Somme à propos d'une capture dans le Puy-de-Dôme.

Microneta viaria (Blackw.). — N. : Anzin, Douchy ! S. : Bois de Bacouël (F. R., 1891).

Centromerinae

Centromerita bicolor (Blackw.). — N. : Anzin, Denain, Douchy, forêt de Vicoigne ! S. : Saint-Fuscien (*Tmeticus b.*, F. R., 1887).

Centromerita concinna (Thor.). — N. : Hérin !

Centromerus aequalis (Westr.). — N. : Forêt de Mormal, 1 ♀, 26-iii-1959 ! Douchy, 1 ♀, 23-v-1944 ! [1].

Centromerus dilutus (O. P. Cambr.). — N. : Wavrechain-sous-Denain, Douchy, Rœulx ! S. : Ault (*Sintula d.*, E. S., 1884 ; F. R., 1888).

Centromerus expertus (O. P. Cambr.). — N. : Wavrechain-sous-Denain, 1 ♂ 4 ♀, 11-xi-1945, dans le marais ! Douchy (J. D., 1934 *c*, 1943 *b*), assez fréquent ; Lourches, 1 ♀, 23-v-1944, dans les mousses humides ! Rœulx (J. D., 1943 *b*) ; forêt de Vicoigne, 1 ♂, 23-ix-1948, au bord de la Mare à Goriaux ! S. : Ile Sainte-Aragone, marais de Saint-Sauveur (*Tmeticus e.*, F. R., 1891).

1. *Centromerus capucinus* (Simon), qui a été capturé dans le Hainaut belge, devrait se retrouver dans le Nord.

Centromerus pabulator (O. P. Cambr.). — S. : Ault (*Tmeticus p.*, E. S., 1884, F. R., 1887 ; E. S., 1929).

Centromerus prudens (O. P. Cambr.). — N. : Douchy, 2 ♀, 12-XI-1944 !

Centromerus silvaticus (Blackw.). — N. : Avesnes-le-Sec, Wavrechain-sous-Denain, Douchy, Rœulx, forêt de Vicoigne, forêt de Marchiennes ! S. : Amiens, Ault (*Tmeticus s.*, E. S., 1884 ; F. R., 1887).

Oreonetides abnormis (Blackw.). — N. : Forêt de Mormal, Douchy, Wallers, bois d'Hartin ! S. : Bois du Trou Wargnier (F. R., 1891).

BIBLIOGRAPHIE

Bonnet, P., 1945. — Bibliographia Araneorum. Tome I. Toulouse, 1945, xvii + 832 p., 28 pl. Réimpr. Entom. Soc. Amer., 1968.

Cooke, J. A. L., 1967. — On the true identity of *Pelecopsis nemoralis* Bl. and related species. *British Spid. St. Group, Bull.*, n° 33, pp. 5-7.

Denis, J., 1943 *a*. — Araignées du nord de la France (3e note). *Bull. Soc. entom. France*, **48**, pp. 105-108.

— 1943 *b*. — Araignées du nord de la France (4e note). *Bull. Soc. zool. France*, **68**, pp. 129-131.

— 1944. — Notes sur les Érigonides. IV. Sur les genres *Enidia* Smith et *Dismodicus* Simon. *Revue franç. Entom.*, **11**, pp. 21-29.

— 1945. — Notes sur les Érigonides. X. Remarques sur le genre *Entelecara* E. Simon avec la description de formes nouvelles du genre *Plaesiocraerus* E. Simon. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, **80**, pp. 203-215.

— 1946. — Sur quelques Araignées capturées récemment en France. *Revue franç. Entom.*, **13**, pp. 36-44.

— 1947 *a*. — Notes sur les Érigonides. XI. Les espèces françaises du genre *Oedothorax* Bertkau. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, **81**, pp. 131-158.

— 1947 *b*. — Une bonne station entomologique dans le Nord ? *L'Entomologiste*, **3**, pp. 233-236.

— 1948. — Notes sur les Érigonides. XVI. Essai sur la détermination des femelles d'Érigonides. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, **83**, pp. 129-158.

— 1949. — Notes sur les Érigonides. XVII. Additions et rectifications au tableau de détermination des femelles. Descriptions d'espèces nouvelles. *Ibid.*, **84**, pp. 245-257.

— 1951. — [Captures d'Araignées en forêt de Marchiennes]. *Bull. Soc. entom. nord France*, n° 57, p. 5.

— 1952. — Araignées capturées en forêt de Saint-Amand. *Ibid.*, n° 63, pp. 3-4.

— 1955. — Les Érigonides du nord de la France. *Ibid.*, n° 78, pp. 1-3 et n° 81, pp. 1-3.

— 1956 *a*. — Quelques Araignées de Clairmarais. *Ibid.*, n° 83, pp. 2-3.

— 1956 *b*. — Capture dans le Pas-de-Calais d'une Araignée d'Europe centrale. *L'Entomologiste*, **11**, 1955 [1956], p. 138.

— 1958 *a*. — Une Araignée nouvelle pour le nord de la France. *Bull. Soc. entom. nord France*, n° 98, p. 3.

— 1958 *b*. — Quelques Érigonides et Linyphiides de Clairmarais (P.-de-C.). *Ibid.*, n° 99, p. 2.

— 1961. — Quelques Araignées intéressantes du nord de la France. *Ibid.*, n° 114, pp. 1-2.

— 1962. — Notes sur les Érigonides. XXIII. A propos de *Dicymbium nigrum* (Bl.). *Bull. Soc. zool. France*, **86**, pp. 468-471.

— 1963. — Quelques Araignées recueillies en forêt de Marchiennes. *Bull. Soc. entom. nord France*, n° 129, pp. 2-3.

Locket, G. H., et A. F. Millidge, 1962. — The identity of *Entelecara erythropus* (Westring) and *E. media* Kulcz. *Ann. Mag. nat. Hist.*, **5**, 13, pp. 433-434.

Sollaud, E., 1925. — La faune et la flore des terrains salés de l'embouchure de la Slack (Boulonnais). *C. R. Soc. Biogéogr.*, **2**, pp. 76-77. [non répertorié par Bonnet 1945].

Wunderlich, J., 1970. — Zur Synonymie einiger Spinnen-Gattungen und Arten aus Europa und Nordamerika. *Senck. biol.*, **51**, pp. 403-408.